

Placering av fällor

- Tre fällor per fält, placeras längs trädridåer eller buskage
- Avläsning minst en gång per vecka
- Fällans nederkant sätt i höjd med blasten

Vinklade klisterfällor används i en del andra länder och kan vara en möjlig väg för att fånga de första flugorna. Vilket blir allt viktigare då vi inte har tillgång till systemiska preparat.

Vitvingefjärilar

Bilder från Östgötaentomologerna



Framsida av Rovfjäril (hona)

Baksida av Rovfjäril



Framsida av Rapsfjäril

Baksida av Rapsfjäril



Framsida av Kålfjäril (hane)

Baksida av Kålfjäril

Tabellen visar några av de grödor som är värdväxter för bomullsmögel

Kulturtillhörighet	Gröda
Kålväxter	Vitkål
	Blomkål
	Broccoli
	Brysselkål
Gurkväxter	Frilandsgurka
	Squash
	Pumpa
Ärt- och bönväxter	Ärter
	Bönor
Flockblomstriga växter	Selleri
	Morot
	Palsternacka
Potatisväxter	Potatis
	Tomat
Mållaväxter	Sockerbeta
	Rödbeta
	Spenat
Lilje- och lökväxter	Kepalök
	Sparris
Rosfamiljen	Jordgubbar
	Hallon
Korgblommiga växter	Sallat
	Kronärtskocka
	Jordärtskocka